

Рекомендация после проведения витальной ампутации пульпы постоянных зубов

Уважаемые родители!

Сегодня Вашему ребенку было проведено лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации. Для того, чтобы избежать нежелательных осложнений, помните:

1. Действие анестезии прекращается по истечении 3 часов, поэтому в течение этого времени следите за тем, чтобы Ваш ребенок не травмировал накусыванием мягкие ткани щек и языка, т.к. чувствительность этой области будет снижена, и ребенок не сможет адекватно контролировать смыкание зубов.

2. Выполняйте все рекомендации вашего лечащего врача. Принимайте только те препараты, которые были назначены вашим лечащим врачом.

3. Не меняйте препараты на аналоги без консультации с Вашим лечащим врачом.

4. Если Вам покажется, что Ваш ребенок почувствовал себя хуже, после назначенных препаратов, не меняйте их самостоятельно, обязательно свяжитесь с Вашим лечащим врачом.

5. Если вы наблюдаете ухудшение самочувствия Вашего ребенка после лечения в этот же день или на следующие сутки, обратитесь в нашу клинику за консультацией, не принимайте решение самостоятельно.

6. Возникновение болей в пролеченном зубе свидетельствует о тотальном распространении воспаления по всей пульпе зуба. Необходимо срочно обратиться в клинику на осмотр, не дожидаясь самостоятельного стихания болей.

7. В случае, если после проведенного лечения Вы обнаружили дефект в пломбе или ее выпадение, необходимо срочно обратиться в клинику для восстановления зуба.

8. Помните, что данный вид лечения подразумевает строгое наблюдение за состоянием зуба. Необходимо после проведенного лечения проводить контрольные осмотры в следующие сроки: 2недели / 1мес / 3мес / 6мес /1год, далее – ежегодно. Также необходимо проведение контрольных визиографических снимков. Это позволит вовремя избежать возможных осложнений и негативных реакций со стороны организма.